Je m'entraîne pour le contrôle

Corrigés

Exercice 1

- a.** Les antécédents de 100 par la fonction carré sont $-\sqrt{100}$ et $\sqrt{100}$, c'est-à-dire -10 et 10 .
Les antécédents de 2 par la fonction carré sont $-\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$.
- b.** L'ensemble des solutions de l'inéquation $x^2 < 100$ est l'intervalle $]-10; 10[$.
L'ensemble des solutions de l'inéquation $x^2 > 2$ est l'intervalle $]-\infty; -\sqrt{2}[\cup]\sqrt{2}; +\infty[$.
- c.** L'ensemble des solutions est l'intersection des deux ensembles trouvés à la question **2b**, donc $\mathcal{S} =]-10; -\sqrt{2}[\cup]\sqrt{2}; 10[$.

Exercice 2

a. On a $0,001 = \frac{1}{1\,000} = \frac{1^3}{10^3} = \left(\frac{1}{10}\right)^3$ donc $0,001 = (0,1)^3$, l'unique antécédent de 0,001 par la fonction cube est 0,1.

Comme $\frac{1}{27} = \left(\frac{1}{3}\right)^3$, l'unique antécédent de $\frac{1}{27}$ par la fonction cube est $\frac{1}{3}$.

b. L'ensemble des nombres vérifiant $0,001 < x^3 < \frac{1}{27}$ est $]0,1; \frac{1}{3}[$.

Exercice 3

- a.** La courbe représente la fonction inverse, d'équation $y = \frac{1}{x}$.
- b.** Les points A et B ont la même abscisse donc la droite (AB) est parallèle à l'axe des ordonnées. L'ordonnée du point B étant égale à 0, on en déduit que la distance AB est égale à l'ordonnée du point A. Le point A, d'abscisse $x = 0,25$, appartient à la courbe d'équation $y = \frac{1}{x}$ donc son ordonnée est $\frac{1}{0,25} = 4$.

On en conclut que $AB = 4$, c'est-à-dire que la hauteur de la rampe vaut 4 mètres.

- c.** La zone F est l'ensemble des points dont les abscisses d sont comprises entre 0,25 m et 3 m. On cherche les abscisses d des points de la courbe, modélisant la rampe, qui ont une ordonnée h comprise entre 0,45 et 3,5.

L'abscisse du point de la courbe qui a pour ordonnée 0,45 est $\frac{1}{0,45} = \frac{20}{9} \approx 2,22$.

L'abscisse du point de la courbe qui a pour ordonnée 3,5 est $\frac{1}{3,5} = \frac{2}{7} \approx 0,29$.

Donc pour les points de la courbe, si $0,45 < h < 3,5$ alors $0,29 < d < 2,22$.

Comme $0,25 < 0,29 < d < 2,22 < 3$, on en conclut que Pauline reste dans la zone F.

Exercice 4

- 1.** $1 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 \leq 1$.

Les antécédents de 1 par la fonction carré sont -1 et 1 . Par résolution graphique, on détermine que l'ensemble des solutions de l'inéquation $x^2 \leq 1$ est $\mathcal{S} = [-1 ; 1]$. On a donc bien $1 - x^2 \geq 0$ pour tout nombre réel x dans l'intervalle $[-1 ; 1]$.

- 2. a.** On observe, dans un repère orthonormé, que la courbe a la forme d'un demi-cercle.

- b.** Pour tout nombre réel x dans l'intervalle $[-1 ; 1]$, l'image de $-x$ par la fonction f est :

$$f(-x) = \sqrt{1 - (-x)^2} = \sqrt{1 - x^2} = f(x)$$

car $(-x)^2 = x^2$.

- 3.** Comme les nombres a et b sont positifs :

$$a < b \Leftrightarrow a^2 < b^2$$

$$\Leftrightarrow -a^2 > -b^2 \quad (\text{car multiplier par un nombre négatif change le sens de l'inégalité})$$

$$\Leftrightarrow 1 - a^2 > 1 - b^2 \quad (\text{on ajoute 1 aux deux membres})$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{1 - a^2} > \sqrt{1 - b^2} \quad (\text{car prendre la racine carrée de deux nombres positifs conserve leur ordre})$$

$$\Leftrightarrow f(a) > f(b)$$

La fonction f est donc décroissante sur l'intervalle $[0 ; 1]$.